幼幼新書

幼幼新書卷第十一

癇論候法　凡十二門

後學古吳陳履端干始輯
常熟嚴　澂道徹校

癇論第一

千金論癇痓病者藏氣不平也新生即癇是五藏不
斂血氣不聚五脈不流骨怯不成多不全育一月至
期歲内癇者乳養失理血氣不和風邪所中也身熱
掣瘲驚啼叫喚而後發脉浮爲陽病在六府在肌膚
易治身冷不驚掣不啼呼脉沉爲陰病在五藏在骨

髓極難治病發身軟時醒為癎身強直反張如弓不時醒為痓諸反張大人脊下容側手兒容三指不治脉浮沉復有大小滑澀虛實遲駃諸證各依脉治本草癎有一百二十種微異于常便是癎變蒸後有病並寬惟中風最暴卒兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癎及變蒸日滿不解宜龍膽湯一切癎門

癎有三種風癎驚癎食癎然食癎十無一二先寒後熱是也風癎緣衣煖汗出風因入也初時屈指如數迺發驚癎起于驚怖大啼迺發微者急持之勿更驚

或自止初時不乳哺吐而變熱後發食癇用四味紫丸（變蒸門）遂癖飲最良去病速而不虛赤丸（無此千金癖結脹滿篇紫雙丸用朱砂色赤用巴豆甘遂比紫丸當駛疑即此）駃宜重病兒不乳紫丸下之始生氣盛有惡下無損不下成大疾難治紫丸不下用赤丸又不下倍之若下后餘熱不盡稍服龍膽湯并摩赤膏（一切癇門）風癇當以猪心湯下驚癇按圖灸及摩生膏（壯熱門）不可大下驚癇心氣不定（一作足）下之內益虛難治故兒常慎驚勿令聞大聲抱持常安徐勿令怖又天雷當塞耳作細聲亂之常徽驚以長

血脉大驚灸驚脉六十日内灸者驚更甚百日後灸善兒有熱不乳哺卧不安又數驚此癇之初也兒眠小驚一月一以紫丸下之减其盛氣不病癇立夏後勿妄灸若不欲吐下浴以除熱湯粉以除熱散（並在熱門）摩以赤膏并塗臍中令涼處勿禁水漿飲以新水兒衣薄乳食不消大便醋臭癖之漸也紫丸微消之服法從少起常令大便稀稀後漸减不醋臭止藥冬月下無所畏夏月下難差有病不可不下下後腹小脹當節哺乳數日勿妄下又乳哺令多少有常兒漸大

稍增之若減少已有小不調便微服藥但乳勿哺甚者十許日微者五六日自當如常若都不食而但飲乳是有癖為疾重不下致寒熱或吐發癇或更下痢治其輕時兒不耗損而病愈速凡糞黃臭者腹有伏熱宜龍膽湯若白而醋而挾宿寒不消宜紫丸微者令內消甚者小下復節乳哺則胃氣平和否則病易復復下傷胃令腹脹滿而過傷矣凡兒癖脉大必發食癇下之便愈當候掌中有三指脉不可令起不下發癇難療早下脉終不起脉在掌中尚可療至指則

病增凡兒腹有疾則寒熱寒熱則血脉動血脉動則心不定心不定則易驚驚則癇發速

寶鑑兒有數疾久而不醫變為癇壯熱夾驚傷寒瘀飲發驚洞泄咳嗽夜啼客忤霍亂吐瀉哯乳臍瘡常有青黃水久則俱成癇

惠眼驚不醫成風風不醫成癇癇不醫成痓既成痓難以用藥癇有數種有驚風癇多驚即發有乳風癇食乳衝肺即發發即吐乳急有肝風癇四季多發發即寒熱噤有肺風癇冬月多發發即口噤面黑大抵

癇不害命只邪氣在心須重吐下常服鎮心湯藥如覺一邊手足動微覺麻痺不能動手兼語不清齒牙黑此風涎及邪塞竅也

癇候第二

東氏十歲以上為癲十歲以下為癇其狀或口眼相引而目睛上搖手足瘛瘲背脊強直頸項反折諸方說癇名證不同大體有風癇驚癇食癇三種兒氣血微弱易為傷動故也正發時手足掣縮慎勿捉持捉則曲戾不隨

指迷癇有數般且說五藏表裏受風形狀初受驚癇
目反視踞坐舉頭唇支青面青黃此病傳肝若唇黑
眼慢旬日死風癇口吐白沫已傳心放齒咬人或即
口頰手指青黑或醒或發若指黑色面青黑五日內
死臍風發癇面虛腫搐搦手足動搖兩臉白病傳肺
面如土色者七日死搐搦或夢中啼笑下齒咬人似
慢脾狀若眉帶黑色病傳腎腎已絶旬日死脾癇喉
如鋸多睡不進乳食口乾唇赤眼白多旦夕死

驚癇忤是三候第三

漢東王先生驚癇忤三候略相似皆口面青黑嘔吐涎沫頭項強直手足搖動但驚即發拳搐喉中涎響雙目直視癇即搐搦涎出亦響口眼相引目睛上擺忤即掣瘲口吐青黃白沫惟眼不上插為不同也病初治亦一法

歸魂散治驚癇忤手足瘛瘲頭項強直狀似角弓

蝎梢炒半錢　蜈蚣赤脚半條炙　水銀粉　腦麝各一字

花蛇肉酒浸炙一錢　天南星薑製一宿五分

川烏頭尖生七個

末嬰孩半字量加至半錢金銀薄荷湯調更量虛實

候癇法第四

巢氏癇未發欲發候或温壯連滯或搖頭弄舌或睡裏驚掣數齧齒

千金癇惡候有不及求醫而困者然氣發于內必先有候當察其精神而探之

手白肉魚際脉黑者是癇赤者熱青大者寒青細者為平

鼻口乾燥大小便不利

眼不明上視喜陽　　目瞳子卒大異常

喜欠目上視

耳後高骨上有青脇盛臥不靜刺青脇出血　寶鑑三五路青脈如線起

髮逆啼笑面暗不變

鼻口青時小驚　　目閉青時小驚

身熱頭常汗出　　身熱吐哯而喘

身熱目時直視　　身熱小便難

身熱目視不精

卧惕惕而驚手足搐振　卧夢笑手足動搖

意氣下而妄怒

咽乳不利

吐痢不止厥痛時起

弄舌搖頭

二十候癎之初也灸陽脉所應或重手爪之令兒驟啼乃絶依方與湯嬰孺並服五石紫丸

直視　瞳子動

腹滿轉轉鳴　下血身熱

口噤不得乳　反張脊強

汗出發熱　卧不寤手足掣瘲喜驚

八候癎之劇也非湯丸能救當灸之

截癎法第五

張渙論驚不已變癎有不因驚成癎者未發前壯熱連滯不歇素有痰涎咽聲呀呷或摇頭弄舌目斜視眠睡驚掣多欲發癎宜截之

外臺黑丸療諸癖結痰飲兒欲發癎

桔梗　桂心各四分　巴豆八分熬　芫花二錢分熬

杏仁五分熬

末擣巴杏膏和擣千杵入蜜擣二千杵丸如胡豆

㢡服一二丸兒生十日丸如黍諸腹不快體中覺

患服之利愈忌猪葱蘆笋等

聖惠牛黃散治兒未百日服口吐沫欲作癇腹有冷

熱癖

牛黃　細辛　黃芩　當歸炒

甘草炙　防風各一分　柴胡一分半　川大黃炒

蜣蜋炙各三分　蚱蟬炙三枚

散一錢水一盞煎五分和滓不時量兒溫服

鈎藤散治壯熱欲發癇時時四肢抽掣吐白沫

鈎藤　甘草炙　川升麻　石膏各半兩

人參　子芩　犀角　川大黃炒各一分　蚱蟬炙三枚

散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合牛黃末一字量服

治頭額體背俱熱大便秘澀服赤心悶乍驚乍驚精

神昏濁與人不相主當欲作癎藍葉散

藍葉　人参　知母各半兩　鈎藤

川升麻　葛根各三分　子芩　犀角

射干各一分　玄参二分

細末五歲兒竹瀝半合調半錢服量加若未辨单

服玄参犀葛根竹瀝薑大豆地黄汁又蚯蚓糞水

調服

牛黄丸治驚熱入心成癎面色不定哭不出熱作時

不吃乳食大便秘澀眼番露白手足逆冷

牛黃　川大黃　獨活各一分　川升麻
琥珀　菉豆粉　大麻仁各半兩
羅末蜜丸桐子大不時湯研一丸服量兒加金銀
箔各五片藥兩丸化下
治欲發癇極熱生葛汁飲
生葛根汁　竹瀝各一合　牛黃杏仁大
和服半合量加
嬰孺治驚熱發癇消熱定驚煎
柴胡　升麻　梔子　芍藥各七分

子芩　知母各八分　寒水石錢二分　竹葉一升

甘草二分　杏仁六分

水四升七合煮升半絞滓內蜜葛汁文武火煎勻

不住手至升二合一月兒一合為三服中間進乳

二歲加至二合日二夜一溫服

變蒸時患驚癇已服四味湯紫丸下後猶熱腹脹目

視除熱地黃汁湯

地黃汁半合　黃芩三分　大黃　甘草炙各一分

梔子仁二分

水八合煮四合去滓下地黃汁服一合日三夜一

五藏癇第六

千金論肝癇面青目反視手足摇

心癇面赤心下有熱短氣息微數

脾癇面黃腹大喜痢

肺癇面目白口沫出寶鑑面目反視如枯骨

腎癇面黑目正直視不摇如尸

膈癇目反四肢不舉

腸癇不動摇寶鑑直而不至痓

錢乙論犬癇反折上竄犬叫肝也
羊癇目瞪吐舌羊叫心也
牛癇目直視腹滿牛叫脾也
雞癇驚跳反折手瘲雞叫肺也
猪癇如尸吐沫猪叫腎也重者死病後甚亦死
五色丸
朱砂半兩　鉛三兩同水銀熬　水銀一分　雄黃熬二兩
真珠一兩
蜜丸麻子大金銀薄荷湯服三丸

六畜癇第七 灸法在後

千金論犬癇手屈拳攣 寶鑑手屈足攣

馬癇張口搖頭馬鳴欲反折

牛癇目正直視腹脹

羊癇揚目吐舌

猪癇吐沫 寶鑑振目視人

雞癇搖頭反折喜驚自搖

寶鑑又有烏癇唇口撮聚目手俱搖蛇癇身軟頭舉吐舌視人

博濟犬癎犬聲馬癎馬聲牛癎牛聲羊癎羊鳴雞癎雞鳴五癎者腑臟相引邪氣盈起寒厥各識手顫口吐沫須臾如醒復作

一切癎第八

外臺天下有女鳥名姑獲又名鈞星鬼雨夜毛落兒衣使作癎死即化其兒故兒十歲內衣勿露八月尤忌此鳥無雄不產飛鳴村里喚得來

惠眼癎一日之中常三五發作驚治難差此驚邪傳入筋骨（一經胳）睡驚膏重下（驚風門）次朱砂膏（驚熱門）夾去

風藥調理如吐後不語無妨吐損心氣恐來年此時發後下前藥愈

茅先生初癇歌

渾身壯熱腰背強兩眼瞪睙是尋常四肢抽掣多啼叫時發時醒仔細詳

癇死候歌

四肢癮瘲脉還沉身體如綿不暫醒緊噤牙關難進乳更兼腹滿轉虛鳴汗出熱來時又至渾身壯熱喜生驚直饒便是盧醫手手足縱橫也

不停

本草臘月烏鴉一隻入瓦瓶泥煨燒灰飲下

秘錄竹茹三兩醋三升煎一升量服無治口噤體熱

肘後

茯苓　龍齒各二分　鈎藤　芍藥

黄芩各一分　甘草半分　蚱蟬二枚炙　牛黄二豆大

末竹瀝一合研下東流水二斗金銀各十兩銀器

煮取五升入藥煎升半間乳細服

千金治兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣發熱

吐哯變蒸不解中客人兒氣幷諸癇十歲下皆服客忤及魅加人參當歸龍胆百日兒三銖二百日六銖一歲半兩餘藥準此龍膽湯

龍膽　鈎藤皮　柴胡　黄芩

桔梗　芍藥　茯苓翼作茯神　甘草炙各六銖

蜣蜋二枚　大黄一兩

㕮咀水一升煮五合兒十五日一合分三服

兒二百日內頭身患瘡治差復發五月中忽欬嗽微溫變癇已與常治癇湯得快吐下經日不爾單與竹

瀝一日夕進一升許發時小歠明日服竹瀝湯

竹瀝五合　黄芩三十銖　羚羊角六銖　木防已六銖

大黄二兩　茵芋三銖　麻黄去根節　白薇

甘草炙　桑寄生　萆薢各半兩　白术六銖一作白鮮

㕮咀水二升半煮減半內竹瀝煎一升服二合去一食久進一服一無萆薢

外臺療二十五種癇吐痢寒熱百病不乳哺赤湯

大黄五兩　當歸　芍藥　黄芩

蛇蛻　甘草炙　桂心　人參

赤石脂　牡蠣熬　紫石英　麻黃淨各二兩

篩韋囊盛八歲兒乾棗五枚水八合煮五合兩指

撮藥入湯煮三沸去滓服利微汗自除兒大量加

療百日兒癇連發不醒及胎風體冷面青反張麻黃

五癇湯

麻黃去節二分嬰孺一分　羌活　乾葛各二分

甘草炙二分嬰孺分半　枳實麩炒二分嬰孺三分

杏仁去尖二十嬰孺四十一　升麻　黃芩

大黃各四分　柴胡　芍藥各三分　釣藤皮一分

嬰孺分半　蛇蛻三寸嬰孺二分　蚱蟬二枚各炙　石膏六分

水二升竹瀝五合煎六合服一合嬰孺水二升半竹瀝二合煮六合半作五服

聖惠朱砂散治五癇手足動搖眼目反視口吐涎沫心神喜驚壯熱

朱砂　牛黃　白斂　露蜂房

杏仁麩炒各一分　桂心半分

細羅乳汁調一字服日五量加

牛黃丸治諸癎驚惕掣瘲客忤

牛黃　人參　防風　細辛

赤芍藥嬰孺二分　苦蔞根　當歸各半兩　蚱蟬七枚淨炙

川大黃一兩炙嬰孺三分　甘草三分炙　蛇蛻皮五寸炙

麝一分嬰孺二分　巴豆三十粒淨

末蜜和擣三二百杵丸如麻子初生至百日服一丸一歲至三歲服二丸量加薄荷湯下快利嬰孺兒惕惕驚中人温壯發熱腹滿不調增服

治癎及傷寒百病雷丸膏

雷丸一分　甘草一兩嬰孺五錢　莽草　川升麻各一兩嬰孺二兩

防風一兩嬰孺五錢　桔梗二錢　白朮三錢嬰孺二錢

羅末猪膏一片入鐺慢火煎鎔入藥末柳篦不住攪成膏綿裹合盛摩患者頂及背

靈苑太金箔丸治一切風及癇解心脊壅熱消痰墜涎

金銀箔各百片　辰砂一兩　牛黃　生犀

丁香　沉香　真珠　木香

腦麝　琥珀　鵬砂　烏蛇肉酒炙

天麻酒炙　雄黃　蝎稍　白殭蚕

附子炮　天南星炮　防風　白附子

甘草炙各一錢　香墨半兩

細末金銀箔同水銀三分研如泥再同研蜜丸菉

豆大大人五丸薄荷酒下兒三丸薄荷湯下

天烏散治一切風及癇一名狐肝散

臘月烏鵶一隻用肉骨　臘月野狐肝一具二味入瓶固燒

麝　天麻　犀角各半兩　乾蝎

白殭蚕　蟬蛻　牛黃多益炒　荊芥

藿香　天南星去心　白附子　膩粉

桑螵蛸臘月採各一兩　烏蛇二兩酒浸

細末半錢荊芥湯或豆淋酒空心服兒薄荷湯調

一字

嬰孺壯熱發癇疹自下痢五癇湯

大黃十二分　鈎藤皮　蜂房　麻黃去節各二分

柴胡　山梔仁　知母

芍藥　升麻各七分　蚱蟬三個　石膏十分

蛇蜕五寸炙　杏仁六分

水七升煑二升去滓稍稍如人肌煖以拭身

治客忤中惡發癇乳哺不消中風反折掣口吐舌并疰忤面青目下垂腹滿丁奚羸瘦脛交三歲不行麝香𧄼丸

麝　牛黃　黃連各二兩　桂心

雄黃　烏賊魚骨炙　丹砂　附子

巴豆六十粒去皮炒　特生礬石燒半日各一兩　蜈蚣一個

別研巴豆如胎同蜜和末三千杵拍合收勿泄氣

一月兒服米許三百日服二麻子許量加日夜四五服汗出及痊爲限

治乳哺不時温壯吐利驚掣胎寒腹痛一十五癇四味大黄湯

大黄四分 芍藥 當歸 甘草炙各二分

水三升煮一升一月兒服杏核許日三百日二杏核許此爲準發熱加去節麻黄二分先煮去沫內諸藥反折戴眼掣縮加細辛四分乳不消壯熱有實者倍大黄用刀劈勿碎無是勿增下痢者减三

分之一毋抱少汗病甚大汗汗後溫粉粉之下痫

者勿汗日夜可四服兒夜啼有微熱口唧乳不安

皆宜一方篩韋囊水升半三指撮藥內湯中煎六

合去滓服真新藥可用王汝南戴眼中風體強增

獨活二分妙

治癇手足掣瘲十指顫舌強獨活湯

獨活　麻黃去節　人參各二分　大黃四分

水二升煮麻黃減三合去沫入藥煎九合為三服

治兒壯熱驚癇茵陳湯

茵陳　大黃　黃芩各四分　黃連

硝石無皆硝代　甘草炙各二分

水三升煮一升二合內硝為三服

治腹有熱有寒在胷上逆吐腹中雷鳴而滿驚啼甚

即發癇瘈縮休作有時十味白朮湯

白朮　當歸各一兩　厚朴炙　半夏

甘草炙　人參　芎　薑各二兩

枳實三十枚炙　食茱萸二合

水七升煮二升溫服三合日三夜二

八味固顖膏

大黄十六銖　定粉十八銖　雄黄　黄芩各六銖

雷丸八銖　附子一兩十二銖　生商陸根四兩

煎豬膏三斤去滓入藥沸七上下漉入雄黄攪至凝以摩頂掌中背脇皆遍訖治粉粉之

治百二十癇變蒸宿痞及飲食不節腹滿謳壯朝輕夜甚大小便不通胃弱脾冷牛黄雀屎丸

牛黄　芍藥　甘草　巴豆淨各三分

雀屎白炒　乾薑　當歸　黄芩各二分

芎　　人參各四分　黄蓍一分　麪一合

大黄五分

末蜜丸胡豆大一歲二丸日三不知稍加利爲度

常服良兒初生腹滿口急難取乳大小便不通胷

中作聲服如半黍十日兒一黍若頭身發熱惕惕

驚不安腹脹滿中惡客忤吐乳皆宜百日兒一丸

及寒熱往來朝夕溫壯身熱利久五色及傷寒食

飲脹滿丁奚大腹食不消吐逆量兒服

張渙治五癎手足抽掣口吐涎沫露蜂房散

露蜂房　石菖蒲一寸九節　桂心

遠志去心　人參各半兩　牛黃　朱砂

杏仁麩炒各一分

細末服半錢麝湯調

石壁經羌活膏治驚風三發成癇

羌活　人參　桂心　防風各半錢

蝎　朱砂　硫黃　茯苓

木香各一錢　腦麝少許

末蜜為膏入金銀箔各十片濂研加減薄荷湯下

孔氏治急慢驚風天釣撮口搐搦妳癎壯熱定命丹

蟾酥一錢酒浸　乾蝎七枚　天南星一分　白附子

青黛各半錢　麝少許

末粟米粥丸如菉豆別以青黛衣

陳防禦治胎風諸癎手足瘛瘲目睛上視頸項緊急強直或搖頭弄舌牙關緊急口吐痰沫反拗多啼精神不寧睡卧多驚吐利生風昏塞如醉扁金丹

白花蛇肉製焙　防風　蜈蚣全赤者　乳香各半兩

蝎　朱砂　天南星燒　大草烏燒各

两半　麝一錢　牛黃半錢

羅末炊餅丸如梧子捏匾服三餅荊芥湯化如稀糊抹口中漸嚥下候一時更進

朱氏治驚過發癇或風熱未除心藏積熱涎生膈上壅塞心胸氣亂交橫變癇變候轉頻吐瀉氣弱未曾

補勝金丸

麝　蘆薈　牛黃　胡黃連

等分研熊膽汁丸菉豆大米泔水研三丸服

炙癇法第九

千金兒新生無疾針灸則忍痛動五脉因成癇河洛地寒憙痓兒多灸以防之灸頰以防噤噤者舌下脉急牙車筋急決去血吳蜀地溫無此疾今不詳南北用之多害故田舍兒任自然無夭橫兒驚啼四肢掣動變蒸未解慎勿針灸爪之動其百脉仍因驚成癇惟陰癇噤痓宜針灸爪凡灸癇當先下使虛有實而灸氣逼前後不通殺人癇平旦發足少陽晨朝發足厥陰日中發足太陽黃昏發足太陰人定發足陽明夜半發足少陰視之以定灸穴又有五藏六畜癇或

在四肢或腹内審候隨灸爲善若失其要則爲害也

千金云肝癇灸足少陽厥陰各三壯

心癇灸心下第二肋端宛宛中爲巨闕又灸手心主及少陰各三壯

脾癇灸胃脘三壯夾胃脘傍灸二壯足陽明太陰各二壯

肺癇灸肺俞三壯又手陽明太陽各二壯

腎癇灸心下二寸二分三壯又肘中動脉足太陽少陰各二壯

膈癎灸風府又項上鼻人中下唇承漿皆隨年壯

腸癎灸兩承山又灸足心兩手勞宮又兩耳後高骨各隨年壯又臍中五十壯

右灸五藏癎

馬癎灸項風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服聖惠灸僕參各三壯右足跟骨下白肉際陷中拱足取

牛癎灸鳩尾骨及大椎各三壯嬰孺一壯燒牛蹄末服

羊癎灸大椎上三壯聖惠九椎下節間三壯

猪癎灸耳後高骨兩傍各一寸七壯聖惠灸巨闕鳩尾下一寸陷中

犬癇灸两手心一壯足太陽一壯肋戸一壯嬰孺灸手心足陽明肋戸脚頭两室各一壯

雞癇灸足諸陽各三壯聖惠灸手少陰三壯在掌後去腕半寸陰郄穴陷者中

右灸六畜癇

暴癇灸两乳頭女灸乳下二分身直如死及腹中雷鳴灸太倉及臍中上下两傍各一寸凡六處又灸當腹度取背以繩繞頸下至臍中竭便轉繩向背順脊下行盡繩頭灸两傍各一寸五壯若面白啼聲色不變灸足陽明太陰

右灸暴癇

目上視眸子動灸顖中橫度口畫兩吻際又橫度鼻下畫兩邊折去鼻度半都合口為度從髮際上度之灸度頭一處正在顖上未合骨中隨手動者是此最要處次灸當額入髮際二分許直望鼻為正（嬰孺額上髮際五壯不言入髮二分）次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分許（嬰孺不言二分）次灸項廻毛中次灸客主人穴在眉後際動脈（嬰孺眉後髮際動脈）次灸兩耳門當耳開口則骨解開動張陷是次灸兩耳上捲耳取捲耳上頭是一法大人之

耳上横三指兒自取其指次灸兩耳後高骨上青脉亦可刺血出嬰孺至此有灸人中當近鼻灸承漿次灸玉枕項上高骨次灸兩風池項後兩轅動筋外髮際陷中次灸風府當項中央髮際與風池高下等次灸頭兩角當迴毛兩邊起骨嬰孺此有灸太陽兩眉頭

右頭部十九處兒生十日灸三壯一月五壯五十日七壯病重俱灸輕者唯灸顖中風池玉枕艾使熟炷平正着肉火勢逹病所嬰孺勿一時灸諸處無效續灸輕者顖中額中髮際鼻人中耳門風池玉枕可也凡灸頭風大人不過三十壯風沉者勿頻灸可日日灸又灸

口吻各二七壯

腹満短氣轉鳴灸肺募两乳上第二肋間宛宛中懸繩取當瞳子是次灸膻中次胷堂次臍中嬰孺有百壯次辟息两乳下第一肋間宛宛中次巨闕大人去鳩尾下一寸兒去臍作六分分去鳩尾下一寸并灸两邉嬰孺臆前蔽骨下五分次胃管次金門在穀道陰囊中央

右腹部十二處胷堂巨闕胃管十日兒三壯一月五壯陰下縫中可三壯或隨年壯

脊強反張灸大椎并諸藏俞及督脊上當中從大椎

度至窮骨中窟更從大椎度之灸度下頭是督脊

右背部十二處十日兒灸三壯一月以上五壯

手足瘛瘲驚者灸尺澤（嬰孺肘中約中動脉）次陽明次少商次勞宮（嬰孺掌中央動脉）次心主次合谷（嬰孺手大指岐骨間）次三間（嬰孺大指次指本節後内側曰中）次少陽

右手部十六處其要陽明少商心主尺澤合谷少陽壯數如上

灸伏兎（嬰孺膝上六寸）次三里次腓腸次鹿溪次陽明次少陽次然谷（嬰孺足踝前骨下曰中）

右足部十四處皆要壯數如上手足陽明謂人四指爪驚癇皆灸若風病手足掣瘲灸手足十指端又本節後嬰孺候諸處無效方灸翼云灸第二椎窮骨處以繩度中折處脊骨中也後三折如厶字一角注中央灸下二角脊兩邊五處各百壯灸癇啼易治不啼難治生十數日得癇灸一二壯要緊者三五壯

甲乙經灸本神在曲差旁寸半髮際一云直耳上入髮際四分足少陽陽維之會灸五壯主頭目眩痛頸項強急胸脇相引不得傾側癲疾不嘔沫兒驚癇

臨泣當目上眥直上入髮際五分陷者中少陽太陽

之會灸三壯主頰青不得視口沫淚出兩目眉頭痛
兒驚癇反視
灸縮筋三壯第九椎節下間督脉氣所發俛取主兒
驚癇瘛瘲狂走疾脊急強目轉上插
聖惠灸長強五壯腰俞下脊體骶端陷者中主腰脊
急強不可俛仰顛狂病大小便難洞泄不禁五淋久
痔兒驚癇
灸瘛脉三壯針一分一名資脉在耳內雞足青脉是
主頭風耳後痛兒驚癇瘛瘲嘔吐泄主驚恐失精視

不明眵曹

驚癇灸鬼祿一壯唇內中央絃上炷如麥鋼刀決斷胎癇妳癇驚癇狐魅神邪及顛狂兩手大拇指綿繩縛之灸三壯艾炷半在甲半在肉四處盡燒一處缺不愈神效諸癇灸一壯炷如麥

嬰孺心下一寸宛宛中脊當兊骨上大顀各二七壯

癇差復發第十 癇疾

巢氏癇差更發餘勢未盡兒血氣軟弱或乳食不節或風冷不調或驚動因而重發多成常疹

千金茵芋丸治風癇至長不除或天陰節變便發食飲堅強亦發百脉攣縮行走不正言語不便服之永不發

茵芋葉　鉛丹　秦艽　鉤藤皮

石膏　杜衡　防葵各一兩　菖蒲

黃芩各兩半　松蘿半兩　蜣螂十枚　甘草炙三兩

末蜜丸小豆大三歲內五丸外七丸量加

聖惠鉛丹丸治驚癇復發眩悶倒蹶或湯火不避及百病

鉛丹 朱砂 鐵粉各半兩 牛黃

雄黃 細辛 獨活 露蜂房炙

人參 漢防巳 桂心 甘草炙

川椒炒各一分 蜣蜋炙五枚 蛇蛻炙五寸 雞頭炙一枚

赤茯苓一兩

末蜜和擣二三百杵丸菉豆大粥飲下五丸量加减

鵄頭丸治驚癎經年不斷嬰孺多炸蟬十四個大黃八分

鵄頭一枚皃者炙 桂心 赤芍藥 茯神

露蜂房炙　甘草炙　當歸　芎藭
丹參　牛黄　莨菪子炒各半兩　蜣蜋炙七枚
蛇蛻五寸炙　麝一分
末蜜和擣二三百杵丸菉豆大溫水下五丸量加
嬰孺治癇三十年亦差
苦參三斤　童便斗二升煎苦參取六升
糯米及麴煎作酒熟澄服半雞子許四五歲兒一
升永差腹中病一切氣塊宿冷瘕癖心痛惡病悉
治可放二三年

鎮心銀屑丸治癇差處餘疾

銀屑　黃蓍　大黃　鱉甲炙

甘草炙各四分　細辛　桂心各二分　茯苓

柴胡　黃芩　人參　芍藥各三分

葵子三分　牛黃一分

末蜜丸大豆大服五丸常服良

張渙治胞胳痰涎諸癇差後常服

半夏一兩洗七次　乾薑　川黃連　桂心

南木香各半兩　牛黃　麝一分　朱砂一兩

巴豆净十個炒

末滴水和如黍粥飲下 未周歲乳汁三七歲五粒

癩差身面腫第十一

巢氏兒當風取涼乳哺失節成癩差後身面悉腫因血氣尚虛熱在皮膚與氣相摶致氣不宣泄停併成腫

集效黃芩湯

黃芩 澤瀉 通草即木通各八分 木猪苓

杏仁各六分 柴胡 桑皮各七分 澤漆葉四分

粗末抄三錢水盞半煎五分乳後服

癇差不能語第十二

巢氏心聲為言開竅于口癇雖差風冷之氣猶滯

胳脉心氣不和其聲不發

千金大補心湯

黄芩　附子各一兩炮　甘草　茯苓

桂心各三兩　石膏　半夏　遠志各四兩

薑六兩　大棗廿枚　乾地黄　阿膠

麥門冬各三兩

㕮咀一大撮飴糖半匙許水盞半煮半盞量兒空

心乳前服日二

幼幼新書卷十一

重閱閣刊

幼幼新書 卷十一

幼幼新書卷第十二　五癇異治　凡五門

後學古吳陳履端于始輯
[illegible]芝馮時康廸吉校

風癇第一

巢氏風癇者由乳養失理血氣不和風邪所中或衣厚汗出腠理開（聖惠當風解肌）風因而入初時屈指如數廼發掣縮與豚心湯又身熱瘛瘲驚啼喚（聖惠作笑）而後發脉浮為陽癎內在六府外在肌膚易治身冷不驚瘛而啼喚（亦作笑）發時脉沉為陰癎內在五藏外在骨髓

極難治身軟時醒為癇身強直反張如尸不醒為痓心脉滿大癇瘛筋攣肝脉小急亦癇瘛筋攣尺寸浮直上直下此為督脉必腰背強直不得俛仰風癇三部脉緊急可治兒脉多雀鬪聖惠作啄要以三部為主若緊者必風癇凡癇發手足掣縮慎勿持捉恐曲戾不隨

外臺療風癇卒倒嘔沫不省

麻黄去節　大黄　牡蠣煅　黄芩各四兩

寒水石　白石脂　石膏　赤石脂

紫石英 滑石各八兩 人參 桂心各二兩

蛇蜕一兩炙 龍齒六兩 甘草三兩

散八兩溥絹盛水升五合煑七合絞去滓頓服日再百日內服一合熱多日二服三五日一服亦得

本方無麻黄龍齒蛇蜕忌海藻菘菜生葱熱麪蕎麥猪肉蒜膩粘物

又方

釣藤皮 麻黄去節各二分 龍齒六分碎綿裹 銀一斤

知母 寒水石 梔子 石膏綿裹

杏仁各廿分　子芩十四分　蛇蛻七寸炙　蚱蟬四枚

柴胡十分　芍藥　沙參各八分　生葛汁五分

蜜七合　牡牛黃大豆許十枚　升麻十分

切水六升淡竹瀝二升煮二升四合絞去滓內杏仁葛汁蜜微火煎攪不停手冷餘二升三合成三四歲服二合日再量增大便澁加大黃十分慎麪炙肉魚蒜黏食油膩冷水

聖惠治風癇壯熱心煩痛脉拘急牛黃散

牛黃　朱砂　木香　殭蚕

乳香各一分 乾蝎七個炒 羌活一兩

細羅溫竹瀝半合不時調服半錢量加減

治風癇并心熱多驚七寶鎮心丸

虎睛一對酒浸炙 朱砂飛 雄黃 琥珀

真珠各半兩 金銀箔各五十片 腦麝各一分

細研棗肉丸菉豆大井華水下三九日三量服

犀角散治心藏壅熱變風癇壯熱驚悸心神煩悶多

啼少睡

犀角 羌活 川升麻 柴胡各三分

茯神　白鮮皮　葛根各半兩　甘草炙

蛇蛻炙各一分　蚱蟬三個炙淨　石膏二兩　鈎藤半兩

子芩　川大黃炒各一兩　麥門冬焙半兩

散一錢水小盞煎五分量服

治風癇發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸

虎睛一對酒浸炙　朱砂飛　麻黃去根節　鈎藤

柴胡　白鮮皮　川升麻　雷丸

沙參　牛黃各半兩　防風　子芩

川大黃炒　鐵粉　銀屑　梔子仁

羌活各三分　龍齒　石膏飛各一兩　蚱蟬四枚去淨

細辛一分

末蜜和擣二三百杵丸如菉豆薄荷湯下三丸日三三歲外加

治風癇天吊雄黃散

雄黃　熊膽各半錢　朱砂　天麻

鉛霜各一分　牛黃　晚蠶蛾　天竺黃各半分　馬牙硝半兩　麝一錢

末不津器貯溫水調半錢量加減

治風癇發即迷悶抽掣多痰良久不醒牛黄丸

牛黄 麝 乾蝎 半夏湯洗七次

蟬蛻各一分 天南星 白附子 殭蚕

天麻各半两

並生末煮棗三七枚水銀一两同研星盡入藥丸菉豆大隔日發者煎牛黄乳汁下三丸日三驚風荆芥湯下两丸

治心熱風癇發歇不定

天靈蓋酥炙 黄連一分

粗散一錢水小盞煎五分溫服量加

勑賜神驗方治熱風癇兼失心者

菖蒲　宣連　白朮　車前子

生地黄　苦參　地骨皮

等分末蜜丸如菉豆食後服十五丸不時米飲下

兼令長壽忌猪羊肉血飴糖桃梅菓物

嬰孺治少小風癇晝夜數十發麻黄湯

麻黄去節　黄芩　黄連　大黄各一分

甘草二分炙

水一升先煑麻黄五沸去沫內諸藥煑五合爲五服日夜再服

治風癎瘛瘲身汗而頭獨與小炷灸頂上旋毛中三壯訖白术湯浴之菖蒲湯亦佳

白术五兩

白米泔二升煑三沸適寒温洗頭及身差

紫石酒治風癎言語謬錯

紫石英八分　附子三分地　鐵精　茯神

獨活各二分　遠志　桂心各六分　牛黄

蜂房炒各二分 乾薑 甘草炙 人參各四分

絹袋盛清酒五升浸五宿初服一合日二

張渙烏蛇散治風癇角弓反張潮搐及心肺中風

烏蛇梢生一兩 白附子 半夏各一分 天麻

殭蠶 人參 全蝎 羌活

石菖蒲各半兩 川附子一枚重半兩炮去皮臍

粗末二錢水二盞薑十片薄荷五葉煎一盞温時

潛口中

劉氏治風癇驚風

芭蕉自然汁時呷一两口甚者服五升邵孚仲云加麝更佳將元明云風蚛牙頤頰腫痛汁一梳煎八分乘熱嗽腫處頤頰腫牙齦痛爲風牙頤頰不腫蚛牙也

驚癇第二

巢氏兒驚怖大啼精神傷動氣脉不定因驚成癇初欲驚急抱持之驚自止故兒常慎驚勿聞大聲抱須安徐勿驚怖雷鳴當塞耳作細聲以亂之當按圖灸之膏摩之驚癇心氣不足下之內虚難治

本草

猪齒燒灰服半錢并治蛇咬

蛇黄水煮服汁

顱顖虎睛丸治二十四種驚癇壯熱抽掣嘔吐夜啼

眼腫

虎睛一枚聖惠一對　梔子　茯苓各二錢　牛黄少許聖惠

半兩　人參一分聖惠一兩　釣藤　大黄各四分

犀角一分聖惠二兩　蛇蛻七寸聖惠一分燒　黄芩一分

末蜜丸如黍空心熟水下隨年丸輕者一服重者

三服妳汁下亦得毋忌生冷油膩等物

廣利治驚癇迷悶嚼舌仰目

牛黃大豆許蜜水調服又犀角末水服半錢

嬰孺服虎睛中水

肘後熊膽一两和乳及竹瀝服又炙虎睛服

千金鎮心丸治驚癇百病鎮心氣

銀屑十二銖　水銀廿銖　牛黃六銖一無　大黃六分

茯苓三分　茯神　遠志　防巳

白歛　雄黃　人參　芍藥各二分

防葵　鐵精　紫石英　真珠各四分

水銀銀屑研如泥別治諸藥和丸三歲服麻子大

二丸量加

食醫青羊肝五味醬醋食

豬乳滴口中

糜飲與葛粉食

外臺纍得驚癇

釣藤皮　茯神　黃芩　升麻

白蘚皮　沙參各二兩　龍齒三兩　石膏八兩

寒水石六兩　蚱蟬七枚　甘竹瀝湯二升熱

切水九升煮三升溫分三服相去行六七里久兒

細飲忌酷物

聖惠犀角丸治驚癇壯熱心神不定

犀角　麝各半兩　朱砂　天竺黃

牛黃　乾蝎炒各一分　天南星炮半分

末水浸蒸餅丸如菉豆薄荷湯下三丸日三四量

加

虎睛丸治驚癇邪氣壯熱嘔吐心煩躁不安

虎睛一對　牛黃　天竺黃　麝各一分

川升麻　甘草炙　鈎藤　犀角

梔子各半兩　川大黃炒一兩　蚱蟬　蜣螂各淨炒三

枚　蛇蛻五寸燒

羅末蜜丸菉豆大三二歲粥飲研三丸量服

治驚癇頻發不定至寶丸

金銀箔各五十片　川升麻　子芩　犀角

梔子　川大黃炒　朱砂飛各一兩　鐵粉

龍齒各二兩　麥門冬半兩　蜣螂淨三枚炒

末蜜丸如麻子竹葉湯研服五丸量加

治驚癇發熱搐搦鉛霜丸

鉛霜　馬牙硝各半兩　朱砂飛　鐵粉各一兩

麝半分　川大黃炒　人參各三分　羌活

芎藭　茯苓　牛黃　乾蝎炒

龍腦各一分

末蜜丸如菉豆不時荊芥薄荷湯下五丸量服

蚱蟬煎治驚癇頻發久不差肌體瘦弱

蚱蟬淨三枚炙　麻黃去根節　鈎藤各一分　柴胡

芍藥　犀角　知母　沙參
甘草炙　薑汁一合　牛黃一分　生地黃汁
杏仁各半兩　蟬蛻五寸燒　石膏　子芩
蜜　龍齒各一兩
細剉水二大盞煎一盞去滓入竹瀝一小盞煎五
七沸內蜜地黃薑汁慢火煎不停攪約十餘沸瓷
合盛入牛黃攪勻一合分三服量加
治心熱驚狂諸癇熱碧雪
川升麻二兩　黃芩　鉤藤　犀角

青黛各一两 虎睛一對 天竺黄一两半 腦麝各一分

川朴硝一斤 竹瀝三合

虎睛天竺黄腦麝青黛別研入餘並細剉水一斗煎三升去滓澄清下朴硝微火更煎柳木篦攪勿住手硝散入竹瀝虎睛等更攪稍凝新瓦盆盛經宿即凝擣羅散金銀湯調服二錢食後臨卧服老少以意加減

治中風目眩羸瘦兒驚癇五勞手足無力

白羊頭一枚

蒸極熟細切五味汁食或作鱠入五辛醬醋
醫局療脚氣毒遍内外煩熱不解口生瘡狂易叫走
瘴疫毒癘卒死温瘧五尸五疰心腹諸疾疞痛及解
諸熱藥毒發邪熱卒黄等并解蠱毒䰠野道熱毒兒
驚癇百病紫雪

黄金一百两千金翼十六两　石膏　寒水石

磁石　滑石各三斤擣千金無此

水一斛煮四斗去滓

玄參焙　升麻各一斤　羚羊角　犀角

青木香　沉香各五兩　丁香一兩千金四兩　甘草炙八兩

入煎藥汁煮斗五升去滓

硝石四升芒硝亦得每升重七兩七錢半　朴硝精者拾斤千金四升

入前藥汁微火煎搦木篦攪不住至七升投木盆

中半日欲凝入

朱砂飛三兩　麝當門子一兩二錢半千金麝粉半兩

入煎藥汁攪勻寒二日成霜紫色冷水調一二錢

食後臨時加減服

養生治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤

覺夢不祥兒驚癇桃奴丸

桃梟七枚桃實經冬不落者　桃仁十四枚炒　安息香一兩無灰酒飛去砂入上二味熬成膏

生玳瑁一兩　琥珀三分

雄黃桃葉水飛三分　辰砂飛半兩　黑犀磨澄末半兩　牛黃

腦麝各一分

末和前膏丸如雞頭陰乾蜜罷封安淨室人參湯

研一丸服食後臨卧

治憂恚逆衝痞結胷管窒塞噎悶藏府積聚欲作癥

瘕酒食毒痰癖嘔逆有妨食飲兼治驚癇客忤泄利

雞舌香丸

鷄舌香母丁香　墨燒署　麝　牛黃

犀角　鐵鏵粉各半分　棗五枚燒存性　荆三稜一錢

烏梅肉焙一分　巴豆大者十五枚淨肉漿水煮三五十沸用麩炒

末煮糊丸如黃米服三五丸人參湯下漸加至十

丸食後服

嬰孺治驚癇發熱如無癇似熱即服

升麻　子芩　犀角　大黃各六分

水二升半煮升二合漸温服微利忌麪豬魚醋

又月候血青黛新汲水調一錢服童兒增減

治驚癇經年小勞輙發牛黃酒

牛黃　鍾乳各八分　麻黃去節　秦艽

人參各六分　桂心七分　龍角　白朮

甘草　當歸　細辛各五分　杏仁四分

蜀椒三分汗　蜣蜋九枚炙

切入絹袋酒五升浸隨時月數服半合日三

治少小痰實結痞癖或腹內堅強驚癇百病牛黃丸

牛黃　玄參　乾薑各二分　苦參

丹參　桔梗　甘草炙　人參各四分

甘遂炒　沙參炙各五分　䗪虫十四個　大黃十二分

蜀椒四分汗　巴豆百粒炒研　淨葶藶炒各半

末蜜丸如小豆一服二丸飲下

治傷寒温病驚癇八味人參浴湯

人參　牡蠣　雷丸各半升　沙參

苦參　玄參　丹參各一升　大黃三升

水三斗作東向竈葦薪煮三沸停後煮小沸度一

斗許去滓先以三指染藥汁注兒口二七次大染

手濕吻額腹背以後如炊物溫之再浴度盡七升

一日一浴甚者三浴無見風浴時避日及陰

張渙截驚癇安神湯

白茯苓二兩　甘草　犀角各一分　人參

遠志　菖蒲　白鮮皮各一兩　石膏半兩

末一錢水小盞入麥門冬煎五分去滓溫服

鎮心膏治驚癇及癎發挾熱

遠志一兩　漢防已　人參　川大黃炒

茯神各半兩　朱砂飛一兩　龍腦一錢　雄黃水磨一分

金箔卅片　銀箔廿片

細末蜜成膏服一皂子大乳後薄苛湯化

治驚癇悶亂犀角丹

犀角　天南星炒各一兩　乾蝎半兩　朱砂飛半兩

牛黃一分　麝一錢

細末水浸蒸餅丸如黍人參湯服十五粒

萬全牛黃丸治諸癇驚惕掣瘲客忤

牛黃　熊膽　人参　細辛

赤芍藥　當歸炒　菰蔞根　防風各半兩

川大黄一两炒 蚱蟬七枚净炒 巴豆三十枚净肉 蛇蛻五寸炙
麝一分 甘草三分炙
末入巴豆研蜜和杵丸麻子大百日内服一丸至
三歲二丸薄荷湯利為度
犀角丸治驚癇壯熱心神不定
犀角半两 朱砂 天竺黄 麝
牛黄 乾蝎炒 天南星炮 人參各一分
羅蒸餅糊丸如菉豆服三丸薄荷湯下量服
劉氏

青州白丸子半两　陰陽硫黄生熟各豆許

蝎全两個一用梢

末一歲至五歲服半錢至十歲一錢無灰酒下忌

動風物乳母亦忌

趙氏治吐瀉後虗風眼澀多睡潮搐驚癎及丈夫婦

人一切虗風頭旋眼黑惡心吐逆筋脉緊緩手足麻

木身體疼痛精神不爽蛜蜥丸

全蝎炒　僵蚕　雄黄　白附子

天麻　朱砂　麝　南星紙裹炮

半夏浸七次去臍薑煮焙各一分　烏梢蛇尾穿錢一百者佳項後粗處七寸內酒浸炙黃

研細薑汁糊丸如黍三歲下七丸五歲下十丸已上十五丸荊芥湯下不時大人丸如菉豆服二十丸荊芥茶下急用碎荊芥薑濃煎湯化

鄭愈奪命散治驚風癇病眼飜牙緊口內無氣唇赤

赤蜈蚣一條　輕粉　朱砂　麝

白附子　牛黃各一分　水銀棗內研星盡一錢

蟾酥一錢　天南星一個去心　真珠一字　巴豆霜三個

末棗肉和服三丸薄荷湯下口噤礶滴鼻中心煩熱荊芥湯下量服

食癇第三

巢氏云食癇乳哺不節所成

聖惠食癇者由藏府壅滯內有積熱因乳哺過度氣血不調所致皆乳母食飲無常恚怒不節毒鬱于胷便乳兒致結不消熱積腸胃痞塞不通令壯熱多驚四肢抽掣故發癇

張渙云傷飽即發

聖惠代赭丸治食癇抽掣壯熱驚悸乳食不消痰壅發歇不定

代赭　朱砂　馬牙硝　川大黃炒

水銀棗研星盡各一分　金銀箔各卄片　蟾酥一錢

巴豆霜七枚　膩粉　麝各半錢　龍腦半錢

蝎梢四十九個炒　天漿子有物者二七枚炒

末蜜丸如黍薄荷湯下二丸日三量加

虎睛丸治食癇驚風百病

虎睛一對炙　牛黃　朱砂　真珠

甘遂煨　赤芍藥　赤茯苓　甘草炙

牡蠣炒　杏仁麩炒各一分　麝半分　犀角

巴豆霜各半兩

末糯米飯丸如菉豆荊芥湯下二九量加

張渙妙聖丹治食癇利胸膈

木香　代赭　馬牙硝　川大黃炮各一分

蝎梢四十九枚炒　朱砂飛半兩　麝一錢

龍腦半錢　膩粉半分　巴豆霜七個

研滴水丸如黍服三五粒乳後磨沉香湯下量與

熱癇第四 遲癇除熱

聖惠熱癇者氣血不和內有積熱所致兒骨木輕軟腸胃細微易為傷動若乳食失常藏府壅滯蘊蓄生熱不得宣通熱甚發癇口眼相牽手足抽掣口吐白沫皐裡作聲頸項反張腰背強直壯熱呌啼熱癇候

張渙兒心神多不寧將養過溫內生邪熱故多驚甚者成癇

聖惠風壅氣甚心胸痰滯壯熱發癇鈎藤散

鈎藤一分　蚱蟬二個　川升麻　麥門冬

川大黄（炒） 甘草（炙） 子芩（各半兩） 蛇蛻（五寸燒灰）

石膏（一兩）

右為末每服半錢至一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合量兒湯

散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合量兒湯

多竹瀝柴胡

治熱癇瘛瘲身體如火白鮮皮散

白鮮皮 黃芩 川升麻 地骨皮

釣藤 犀角 胡黃連（各三分） 麥門冬

龍齒（各一分） 甘草（炙一分）

散一錢水小盞煎五分去滓入牛黃一字量服

治熱癇嘔吐煩悶體熱子芩散

子芩　人參　犀角　甘草炙

鈎藤各半兩　赤茯苓　川升麻各三分

粗散一錢水一盞煎五分量服

麥門冬散治體熱嘔吐發癇

麥門冬焙一兩　鈎藤半兩　黃芩　赤芍藥

川升麻　茯神　川大黃炒各三分

散一錢水一盞煎五分溫量服

犀角散治熱癇面赤心躁

犀角　釣藤　玄參　蚱蟬淨炒

甘草炙　川升麻　黄芩　梔子各半兩

麥門冬一兩

散一錢水一盞苦竹葉七片煎五分温量服

治熱癇迷悶嚼舌仰目梔子散

梔子半兩　子芩　釣藤　吴藍各一兩

龍齒　石膏各二兩　川大黄炒三兩

散一錢水一盞煎五分量温服

治熱癇發歇不定目直體熱吐沫心神迷悶牛黄丸

牛黃半兩　蚱蟬炒三枚　石膏飛　龍齒各二兩

梔子　川升麻　犀角　胡黃連

釣藤　龍膽　川大黃炒　杏仁炒各三錢

金銀箔各五十片

末蜜和擣二三百杵丸如菉豆竹瀝研五九量加

張渙治諸癇挾熱蟬殼散

蟬殼　人參各半兩　黃芩　茯神

川升麻各一分　牛黃　天竺黃　牡蠣各一錢

細研服半錢荊芥薄苛湯調

癲癇第五

素問奇病論帝曰人有顛疾病名何謂安所得之岐伯曰名胎病得毋胎中時毋有大驚氣上不下精氣并居令子發癇

巢氏云癇兒病也十歲已上為顛十歲已下為癇

聖惠顛癇者風邪熱毒傷手少陰經心為君主神之舍其藏堅固不受外邪風邪蘊積乘之令恍惚不安精神離散榮衛氣亂陰陽相併而發

斷癇虎睛丸治癲發無時口出白沫小便淋瀝

虎睛一對左眼佳曝乾酒浸黃　真珠　蜂房各三錢

鈎藤三分　麻黃去節二分　鐵精　防葵

大黃　子芩　龍齒　銀屑

梔子　羌活各四分　柴胡　升麻

白蘚皮　雷丸燒赤　人參各三分　石膏五分

細辛分半　蛇皮炙五寸　蚱蟬四枚淨炒

末蜜丸如赤豆四五歲五丸日再大兒十丸米飲

下忌生冷油膩

外臺雄黃丸療牛馬猪羊雞癇蔵府相引盈氣起寒

厥不識人氣爭瘛瘲吐沫久而蘇

雄黃　雌黃各一兩一無山　真珠　水銀熬各一兩

千金八錢　鉛丹二兩熬成膏　丹砂半兩千金二兩

末蜜和擣三萬杵丸胡豆大先食服三丸日一再驚

癇亦愈忌生血物

聖惠雄黃丸治癲發無時心悶吐沫

雄黃　鐵粉　朱砂飛　豮猪膽二枚

熊膽一分　鯉魚膽七枚　烏牛膽半枚　青羊膽二枚

麝一錢

末諸膽汁和丸如菉豆金銀湯下五丸量加

虎睛丸治癲癇發無時口出白沫遺大小便不覺

虎睛一對　朱砂飛半兩　雷丸三分　露蜂房

麻黃去根節　子芩　甘草炙　天麻

鈎藤各半兩　防葵　川大黃炒　龍齒

梔子　石膏　蚱蟬炙各一兩　銀箔卅片

麝　牛黃　蛇皮炒各三分　羌活

柴胡　白鮮皮　川升麻　沙參各三分

末蜜和擣二三百杵丸如菉豆粥飲下五丸量加

幼幼新書卷第十二